УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
26.07.2013 № 649
Регистрационное свидетельство №
UA/8146/01/01

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
16.05.2018 № 992

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ДИСМЕНОРМ
(DYSMENORM®)

Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 таблетка содержит Agnus castus ∅ 125 мг (сухой остаток 1 мг), Apis mellifica D3 25 мг, Pulsatilla D3 25 мг, Rosmarinus officinalis D2 25 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, магния стеарат.

Лекарственная форма. Таблетки.

Белые или почти белые, иногда с отдельными пятнами двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой.

Название и местонахождение производителя.
Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Дисменорм является комплексным гомеопатическим препаратом, в состав которого входят четыре хорошо известных монопрепарата, дополняющие друг друга при лечении нарушений менструального цикла и фиброзно-кистозных изменений тканей молочной железы (мастопатии). Дисменорм регулирует ритм, интенсивность и продолжительность менструальных кровотечений и уменьшает симптомы, характерные для предменструального синдрома. Уменьшает дискомфорт при нагрубании и болезненности молочной железы (мастодинии).

Показания к применению. Нарушения менструального цикла, предменструальный синдром, мастодиния, мастопатия.

Противопоказания. Известная гиперчувствительность к токсинам пчелиного яда или к любому другому компоненту препарата, кормление грудью, эстроген-зависимые опухоли или опухоли гипофиза.

Особые предостережения.
При нарушениях менструального цикла, перед началом применения необходимо проконсультироваться с врачом.
Необходимо проконсультироваться с врачом, если состояние не улучшается или ухудшается, или появились дополнительные жалобы.
Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал.
Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Пшеничный крахмал может содержать глютен, но лишь в следовых количествах, поэтому препарат считается безопасным для пациентов с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не следует применять данный препарат.

Пища и напитки.
Вредные привычки, такие как употребление алкоголя, курение, могут ослаблять действие гомеопатических лекарственных средств.

Применение в период беременности или кормления грудью.
Не следует применять препарат в период беременности.
Дисменорм содержит действующие вещество Agnus castus, поэтому его не следует применять в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе другими механизмами. До настоящего времени не установлено.

Дети. Не применять детям до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Способ применения и дозы.
Взрослым и детям в возрасте с 12 лет препарат следует принимать регулярно по 1-2 таблетки 3 раза в день.
Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, медленно рассасывая во рту. Если необходимо, таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.
Улучшение наступает, как правило, через 4 недели. После улучшения состояния частоту приема препарата следует уменьшить. В случае менструальных расстройств Дисменорм применяется до нормализации длительности и частоты менструации, не менее 3 месяцев. Лекарственное средство Дисменорм может быть рекомендован для длительного применения. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Передозировка. До настоящего времени неизвестна.

Побочные эффекты.
Очень редко (<1/10000) или неизвестно (частоту нельзя оценить по имеющимся данным): при приеме лекарственных препаратов, содержащих Agnus castus, возможны такие явления как головная боль, головокружение; нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота и абдоминальная боль, угревая сыпь и нарушения менструального цикла. Есть также сообщения о случаях реакций повышенной чувствительности, проявляющихся в виде кожных высыпаний, крапивницы (образование зудящих волдырей), и реакций высокой степени тяжести, сопровождающихся отеками тканей лица, одышкой и трудностями при глотании. В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций дальнейший прием препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу. Это касается всех возможных побочных реакций, не описанных в данной инструкции.
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует прекратить его применение и обратиться за консультацией к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Вследствие возможной допаминергической и эстрогенной активности действующего вещества - Agnus castus - вероятно взаимодействие лекарственного препарата с препаратами агонистами и антагонистами допаминовых рецепторов, препаратами эстрогенов и антиэстрогенов.
Пациентам следует проконсультироваться с врачом, если они применяют или применяли, или будут применять другие лекарственные средства.

Срок годности. 5 лет.
Не применять после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 80 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Текст согласован