

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ИЛОН
(ILON®)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 г мази содержит терпентин лиственницы – 54 мг, терпентиновое масло – 72 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, канифоль, воск желтый, кислота стеариновая, кислота олеиновая, полисорбат, масло розмариновое, масло эвкалиптовое, масло тимьяновое, тимол, медный комплекс хлорофиллов (E 141).

Лекарственная форма. Мазь.

Светло-зеленого цвета, прозрачная, однородная мазь с характерным запахом эфирных масел и терпентинового масла.

Название и местонахождение производителя.

Цесра Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ, Браунматтштрассе 20, 76532 Баден-Баден, Германия/
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, Braunmattstrasse 20, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтическая группа.

Дерматологические средства. Антисептические и дезинфицирующие средства.
Код АТС D08A X.

Илон является растительным лекарственным препаратом, который способствует кровоснабжению пораженного участка кожи, снимает воспаление и оказывает дезинфицирующее действие. Терпентин лиственницы (*Terebinthina laricina*) и терпентиновое масло (*Terebinthinae aetheroleum*) можно применять местно в виде мазей, гелей, эмульсионных мазей или пластырей.

Мазь способствует созреванию и прорыванию абсцесса, при этом гной полностью вытягивается, что предупреждает капсуляцию гнойных сред воспаления, которые неполностью опорожнены.

Показания к применению.

Местное лечение гнойных воспалительных заболеваний кожи, в том числе абсцессов, фурункулов, карбункулов, панарициев и воспалений потовых желез.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к эфирным маслам или каким-либо другим компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении.

При появлении любых побочных эффектов следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Избегать попадания мази в глаза.

Мазь нельзя наносить на открытые раны или при любых видах сыпи на коже.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В целях безопасности препарат нельзя применять в период беременности или кормления грудью без назначения врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому Илон не рекомендуется применять пациентам этой возрастной категории.

Способ применения и дозы.

Препарат применять наружно, местно, взрослым пациентам. В зависимости от площади воспаления кожи нанести 2-3 см мази и покрыть стерильной марлевой повязкой или пластырем. Повязку менять 1 или 2 раза в день. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Передозировка.

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные эффекты.

Нежелательные явления после местного применения мази Илон были слабо выраженными и преходящими. Возможны аллергические реакции, в т. ч. зуд, отек, покраснение кожи, сыпь, ощущение жжения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Исследований взаимодействия не проводилось; до настоящего времени не было сообщений о каких-либо взаимодействиях. Но необходимо учитывать возможность взаимодействия с другими препаратами для местного применения, косметическими и бытовыми химическими средствами.

Срок годности.

3 года.

Срок годности после первого вскрытия – 3 месяца.

Условия хранения.

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка.

По 25 г или 50 г мази в тубе. По 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.