

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

13.12.2017 № 1386

Реєстраційне посвідчення

№ ЧА/6740/03/01

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ІНФЛЮЦІД (INFLUCID®)

#### *Склад:*

діючі речовини: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1;

100 г розчину містять Aconitum D3 10 г, Gelsemium D3 10 г, Ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus D5 10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин оральний.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора, світло-жовта рідина, іноді з зеленим відтінком, із запахом алкоголю, злегка пряним, злегка солодкуватим.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

#### *Фармакологічні властивості.*

Препарат містить шість активних компонентів, найбільш прийнятних для лікування гострих застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко зупиняє типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м'язів, а також риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб зменшує ознаки виснаження (астенічний синдром) або запобігає їм. Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, сприяє запобіганню розвитку захворювання.

#### *Клінічні характеристики.*

#### *Показання.*

Профілактика і лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

**Протипоказання.** Через вміст спирту Інфлюцид не можна застосовувати хворим з алкогольною залежністю.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

#### *Особливості застосування.*

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат Інфлюцид містить 46 об. % спирту, тому існує підвищений ризик для здоров'я пацієнтів із захворюваннями печінки, хворих на алкоголізм, а також вагітних.

При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні до рівня понад 39 °C, при збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також при появи нових симптомів слід проконсультуватися з лікарем, оскільки може йти мова про хвороби, які вимагають медичної допомоги.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Інфлюїцид у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

#### **Спосіб застосування та дози.**

При гострому захворюванні застосовувати по 10 крапель розчину щогодини (не більше 12 разів на добу) до настання покращення. При подальшому лікуванні – по 10 крапель розчину 3 рази на добу до повного одужання.

Тривалість лікування – 7–10 днів (до повного зникнення симптомів).

Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції рекомендується приймати по 10 крапель розчину 3 рази на добу.

Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип – 1 тиждень.

Розчин приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, потримавши його деякий час у роті перед тим як проковтнути. Дітям віком від 12 років препарат можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці води).

*Діти.* Препарат призначають дітям віком від 12 років.

Дітям віком від 1 до 12 років рекомендується застосовувати препарат Інфлюїцид в таблетках.

#### **Передозування.**

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

#### **Побічні реакції.**

У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання або діарею.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

*Термін придатності.* 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 30 мл розчину у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецептата.

#### **Виробник.**

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/  
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

#### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

текст узгорелю  
13.09.2017