

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### ВІТАНГО (VITANGO)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить сухого екстракту коренів родіоли рожевої (*Rhodiola rosea*) (1,5-5:1) 200 мг (екстрагент: етанол 60% (м/м));

*допоміжні речовини:* целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, діоксид кремнію колоїдний, магнію стеарат, гіпромелоза, кислота стеаринова, заліза оксид червоний (Е 172), титану діоксид (Е 171), антипінна емульсія: симетикон, метилцелюлоза, кислота сорбінова.

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі таблетки, покриті плівковою оболонкою червоного кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.

#### **Фармакологічні властивості.**

##### *Фармакодинаміка.*

Антистресовий, адаптогенний лікарський засіб рослинного походження. Екстракт родіоли рожевої являє собою адаптоген, що стимулює неспецифічну резистентність проти різних стресових факторів завдяки вмісту у коренях органічних кислот, дубильних речовин, бета-ситостерину, двох кристалічних речовин: п-оксифеніл β-етанолу п-тирозину і його глікозиду п-оксифеніл-β-(β-α-глюкопіранозиду)-етанолу родіолізиду. Екстракт родіоли рожевої проявляє свою адаптогенну дію за рахунок нормалізації обміну моноаміну, кортизолу та В-ендорфіну; модуляції системи первинної відповіді на стрес в організмі людини, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. Він також має антиоксидантний ефект, покращує вироблення клітинної енергії, підвищуючи кількість, наприклад аденозинтрифосфата.

##### *Фармакокінетика.*

Дані відсутні.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Застосовується як адаптогенний засіб для запобігання та полегшення психічних і фізичних симптомів стресу та перевтоми (стомлюваність, неврастенія, вегето-судинна дистонія, роздратованість, напруженість).

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату. Вагітність та лактація.

**Особливі заходи безпеки.**

Препарат не рекомендується для застосування пацієнтам з порушеннями функції печінки або нирок через нестачу відповідних даних.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Данні про взаємодію відсутні.

**Особливості застосування.**

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Протипоказане.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим слід приймати 1 таблетку двічі (вранці і в обід) на день за 30 хвилин до прийому їжі, запиваючи склянкою води. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

**Діти.**

Препарат не рекомендується застосовувати дітям (віком до 18 років).

**Передозування.**

Випадків передозування не виявлено.

**Побічні ефекти.**

Можливі реакції гіперчутливості, а також гіпоглікемія. У разі появи небажаних симптомів слід проконсультуватися з лікарем.

**Термін придатності.** 4 роки.

*Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.** Не потребує особливих умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 20 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

Др. Вільмар Швабе ГмБХ і Ко. КГ.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Вільмар-Швабе-Штрассе 4,

76227 Карлсруе,

Німеччина.