

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ІЛОН®**  
**(ILON®)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 г мазі містить: терпентин модрина – 54 мг, терпентинова олія – 72 мг;  
*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, каніфоль, віск жовтий, кислота стеаринова, кислота олеїнова, полісорбат, олія розмаринова, олія евкаліптова, олія чебрецева, тимол, мідний комплекс хлорофілів (Е 141).

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* світло-зеленого кольору, прозора, однорідна мазь з характерним запахом ефірних олій і терпентинової олії.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Ілон® є рослинним лікарським препаратом, який сприяє кровопостачанню ураженої ділянки шкіри, знімає запалення і чинить дезінфікуючу дію.

*Фармакокінетика.*

Фармакокінетичні дослідження не проводилися.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Місцеве лікування гнійних запальних захворювань шкіри, у тому числі абсцесів, фурункулів, карбункулів, панариціїв та запалень потових залоз.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якого допоміжного компонента лікарського засобу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Необхідно враховувати можливість взаємодії з іншими препаратами для місцевого застосування, косметичними і побутовими хімічними засобами.

**Особливості застосування.**

У разі погіршення стану шкіри (збільшення почервоніння, припухлість, біль) або загального стану (лихоманка) слід проконсультуватися з лікарем.

Уникати потрапляння мазі в очі.

Мазь не можна наносити на відкриті рани або при будь-яких видах висипів на шкірі.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

З міркувань безпеки препарат не можна застосовувати у період вагітності або годування груддю без призначення лікаря.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Лікарський засіб застосовувати зовнішньо, місцево, дорослим пацієнтам. Залежно від площі запалення шкіри нанести смужку мазі довжиною 2–3 см та накрити рану стерильною пов'язкою. Пов'язку слід змінювати 1 або 2 рази на день. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально. Не застосовувати більше 10 днів.

*Діти.*

Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому Ілон® не рекомендується застосовувати пацієнтам цієї вікової категорії.

**Передозування.**

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

**Побічні реакції.**

Побічні реакції після місцевого застосування мазі Ілон® були слабко вираженими та мимозніми. Рідко ( $\geq 1/10\ 000$  до  $< 1/1000$ ) виникали алергічні реакції, у т. ч. свербіж, набряк, почервоніння шкіри, висип, відчуття печіння, які зникали після припинення лікування.

**Термін придатності.**

3 роки.

Термін придатності після першого відкриття – 3 місяці.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка.**

По 25 г або по 50 г мазі у тубі. По 1 тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Цесра Арцнайміттель ГмБХ і Ко. КГ /  
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Браунматтштрассе 20, 76532 Баден-Баден, Німеччина /  
Braunmattstrasse 20, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Дата останнього перегляду.**

24.01.2019.