



краплі від кашлю



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

13.09.2019 № 1942

Реєстраційне посвідчення

№ UA/0672/04/01

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ПРОСПАН® КРАПЛІ ВІД КАШЛЮ (PROSPAN® COUGH DROPS)

#### Склад:

діюча речовина: екстракт сухий листя плюща;  
1 мл (30 крапель) лікарського засобу містить 0,02 г екстракту сухого листя плюща (*folia Hedera helix L.*) (5–7,5 : 1); екстрагент: етанол 30 % (м/м);  
допоміжні речовини: вода очищена, етанол 96 %,  
сахарин натрію, олія анісова, олія м'яти перцевої,  
гірка олія плодів фенхелю.

#### Лікарська форма. Краплі.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-коричневого кольору з запахом спирту та фенхеля. В процесі зберігання можливе утворення невеликого помутніння та осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код ATХ R05C.

#### Фармакологічні властивості.

##### Фармакодинаміка.

Рослинний препарат від кашлю. Чинить відхаркувальну, муколітичну та спазмолітичну дію. Знижує вязкість мокротиння та сприяє його відходженню.

#### Клінічні характеристики.

##### Показання.

Для симптоматичного лікування хронічних запальних захворювань бронхів; гострі запальні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.

##### Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу. Пацієнтам, яким лікар суворо заборонив прийом алкоголя, наявіть у мінімальних кількостях, (наприклад після завершення лікування алкогользу), не рекомендовано приймати даний лікарський засіб. Лікарський засіб не рекомендовано застосовувати дітям віком до 2 років (через ризик посилення респіраторних симптомів).

#### Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

Дослідження щодо взаємодії не проводилися.

#### Особливості застосування.

Якщо симптоми захворювання зберігаються протягом тривалого часу, а також при появи задишки, гарячки та гнійного або кривавого мокротиння слід негайно проконсультуватися з лікарем. Застосування дітям віком від 2-4 років потребує рекомендації лікаря. Одночасне застосування з опіатними протикашлювими засобами, такими як кодеїн або дексетрометорфан, не рекомендовано без медичної консультації.

Слід застосовувати з обережністю пацієнтам з гастритом або виразковою хворобою шлунка. Лікарський засіб містить 47 % (об/об) етанолу. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.

**Задатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

#### Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 10 років призначають по 24 краплі 3 рази на добу;

дітям віком від 4 до 10 років – по 16 крапель 3 рази на добу;

дітям віком від 2 до 4 років – по 12 крапель 3 рази на добу.

Краплі слід застосовувати перед прийомом їжі. Дітям рекомендується давати краплі з невеликою кількістю фруктового соку.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Зазвичай курс лікування становить 7 днів. З метою досягнення стійкого терапевтичного ефекту лікування рекомендується продовжувати ще 2–3 дні після зникнення симптомів захворювання. Якщо симптоми захворювання не зникають або, навпаки, стан погіршується, слід проконсультуватися з лікарем.

#### Діти.

Лікарський засіб не рекомендовано застосовувати дітям віком до 2 років (через ризик посилення респіраторних симптомів).

#### Передозування.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Проковтування великої кількості лікарського засобу (більше трьох добових доз) може спричинити нудоту, блювання, діарею та тривожне збудження.

Лікування симптоматичне.

#### Побічні реакції.

Дуже рідко можуть спостерігатися алергічні реакції (задишка, набряк Квінке, висипання на шкірі, крапив'янка) (частота невідома), шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея, біль у животі) (частота невідома). У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

#### Термін придатності. 4 роки.

Термін придатності після відкриття флакона – 6 місяців.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

#### Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

#### Упаковка.

По 20 або по 50, або по 100 мл у флаконі з пробкою-крапельницєю; по 1 флакону в картонній коробці.

#### Категорія відпуску. Без рецепті.

#### Виробник.

Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/  
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.

#### Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Херцбергштрассе 3, 61138 Нідердорфельден,  
Німеччина/  
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden,  
Germany.

**Дата останнього перегляду. 13.09.2019.**



ENGELHARD