

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.12.2020 № 2931
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5193/01/01

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
12.01.2023 № 68

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

АльпеКід Денто **(AlpeKid® Dento)**

Склад:

діючі речовини: 1 таблетка містить Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, тальк, лактози моногідрат, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору двоплощинні таблетки зі скошеною гранню.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Активні компоненти лікарського засобу зменшують болісні явища при прорізуванні зубів, що супроводжуються оталгією (вушним боєм), болісною чутливістю ясен, пропасницею і діареєю.

Клінічні характеристики.

Показання.

Болісні явища при прорізуванні зубів, що супроводжуються оталгією (вушним боєм), болісною чутливістю ясен, пропасницею і діареєю.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Особливості застосування.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.


Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

При відсутності поліпшення після 3 днів лікування слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб призначений для застосування дітям.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Лікарський засіб призначений для застосування дітям.



**Спосіб застосування та дози.**

Дітям від народження до 1 року:
при гострих симптомах приймати протягом перших двох днів по 1 таблетці щогодини, але не більше 6 таблеток на добу; після ослаблення симптоматики – по 1 таблетці 3 рази на добу.

Дітям віком від 1 року до 6 років:
при гострих симптомах приймати протягом перших двох днів по 2 таблетки щогодини, але не більше 12 таблеток на добу; після ослаблення симптоматики – по 2 таблетки 3 рази на добу.

Курс лікування: 2-4 дні для кожного випадку прорізування зубів. Залежно від кожного індивідуального випадку прорізування зубів можливі безперервні переходи від курсу до курсу або повторення курсів.

Таблетки приймати за пів години до або через пів години після їди, даючи їм розчинитися у роті. При лікуванні дітей грудного віку таблетки можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Діти. Препарат призначати дітям від народження до 6 років.

Передозування.

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, можливе тимчасове погіршення симптомів. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.
або

По 30 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.**Виробник.**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

Дата останнього перегляду. 12.01.2023