

### **ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
16.01.2021 № 60  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/4951/01/01**

### **ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
12.01.2023 № 68**

### **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

## **АльпеКід Дормі** **(AlpeKid® Dormi)**

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить *Cypripedium pubescens* D4 15 мг;  
*Magnesium carbonicum* D10 20 мг; *Zincum valerianicum* D12 15 мг;  
*допоміжні речовини:* мікрокристалічна целюлоза, тальк, лактози  
моногідрат, магнію стеарат.

#### **Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білого або майже білого кольору  
двоплосинні таблетки зі скошеною кромкою.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

#### **Фармакологічні властивості.**

Активні компоненти препарату ефективні при таких симптомах як  
нервозність, дратівливість, відчуття тривожності.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Стани занепокоєння, збудження та безсоння у дітей віком до 6 років.

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає  
застосування інших лікарських засобів.

#### **Особливості застосування.**

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове  
первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом  
препарату і проконсультуватися з лікарем.


Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами  
непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом  
глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.


При відсутності поліпшення після 2-3 тижнів лікування або при  
частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату  
і проконсультуватися з лікарем.

#### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат призначений для застосування дітям.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом  
або іншими механізмами.* Препарат призначений для застосування  
дітям.



**Спосіб застосування та дози.**

Дітям від народження до 6 років: по 1 таблетці 4 рази на добу.

Курс лікування: 2-4 тижні.

Таблетки слід приймати за 30 хвилин до або через 30 хвилин після їжі, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині. При лікуванні немовлят таблетки можна розчинити у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

*Діти.* Препарат застосовують дітям від народження до 6 років після консультації з лікарем.

**Передозування.** У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

або

По 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина  
Steinfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

**Дата останнього перегляду.** 12.01.2023

