

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.04.2019 № 716
Реєстраційне посвідчення
№ UA/13672/01/01

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.03.2025 № 353

ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

КЛІМАКТОПЛАН

(KLIMAKTOPLAN®)

Склад:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Cimicifuga D2 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sepia D2 25 мг, Sanguinaria D6 25 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: сірі, двоплощинні таблетки зі скошеним краєм, іноді злегка плямисті.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат. Інші препарати для лікування гінекологічних захворювань. Код АТХ G02CX.

Фармакологічні властивості.

Клімактоплан містить чотири інгредієнти, які зумовлюють ефект препарату. *Cimicifuga* впливає на гіпоталамус, усуваючи або послаблюючи припливи жару, нервові збудження і депресії. *Sepia* регулює спільні функції гормонів кори

надниркових залоз, статевих органів і гіпофіза. *Sepia*, як і *Ignatia*, насамперед діє на психічні реакції, однак вона впливає також на напади пітливості, припливи жару, головний біль і стан знесилення. *Sanguinaria* особливо ефективна при припливах жару, які супроводжуються минулим рум'янцем і прискореним серцебиттям, а також при головному болю типу мігрені.

Отже, Клімактоплан за рахунок поєднання специфічних інгредієнтів лікує комплекс симптомів, типових для клімактеричного періоду. Завдяки добрій переносимості Клімактоплан можна приймати протягом тривалого часу.

Клінічні характеристики.

Показання.

Клімактеричні розлади: припливи жару, посилене потовиділення, відчуття серцебиття, запаморочення, свербіж, внутрішнє занепокоєння, порушення сну, депресивний стан, нервова збудливість.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дотепер невідома.

Застосування гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Пацієнтам слід проконсультуватися з лікарем, якщо вони приймають або приймали в недавньому минулому будь-які інші ліки, включаючи лікарські засоби, які можна придбати без рецепта.


Примітка. Дія гомеопатичних лікарських засобів може бути різною залежно від загальних негативних факторів, пов'язаних із шкідливими звичками (стимулятори: наприклад, кава або чай, алкоголь, куріння).

Особливості застосування.

Необхідно проконсультуватися з лікарем, якщо стан не покращився або погіршився чи з'явилися додаткові скарги.

Лікарський засіб містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні його застосовувати.

Однею з допоміжних речовин, що входять до складу препарату, є пшеничний крохмаль. У зв'язку з цим таблетки не слід застосовувати пацієнтам з підвищеною чутливістю або непереносимістю глютену.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не застосовують у період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Приймають по 1-2 таблетки 3 рази на день. Максимальна добова доза становить 6 таблеток. Таблетки приймати за півгодини до їди або через півгодини після їди, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині. Якщо необхідно, таблетки можна розчинити в невеликій кількості води. У разі покращення дозування слід зменшити. Кліматоплан слід застосовувати не менше 3 місяців. Лікування може бути продовжено у разі необхідності.

Діти.

Не застосовують дітям.

Передозування.

Передозування не спостерігалось.

Побічні реакції.

При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості, можуть виникнути менструальні та носові кровотечі або збільшитися частота менструальних кровотеч.

Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове погіршення наявних симптомів захворювання (первинне погіршення). У цьому випадку необхідно припинити застосування препарату і проконсультуватися з лікарем.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід звернутися за консультацією до лікаря. Це стосується усіх можливих побічних реакцій, зокрема не описаних у цій інструкції.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C в сухому, недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина /
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

Дата останнього перегляду: 03.03.2025

