

АКТИВ ФЛОРА⁰⁺

бебі +

Лист-вкладиш
по застосуванню
дієтичної добавки

***Lactobacillus rhamnosus* GG DSM33156**
(Probio-Tec® LGG®, Chr. Hansen)

Біологічно активна добавка призначена для новонароджених, немовлят, дітей та дорослих.

Може також застосовуватись у недоношених дітей.

Сприяє збільшенню кількості корисних бактерій у шлунково-кишковому тракті.

АКТИВ ФЛОРА бебі+ містить ліофілізовану культуру лактобактерій *Lactobacillus rhamnosus* GG DSM33156, яку виробляє один із лідерів виробництва лактобактерій у світі – компанія Кр. Хансен. Штам, депонований як DSM33156, на 100% ідентичний штаму вперше виділеному та охарактеризованому вченими, які передали його у 1987 р. компанії Valio та згодом правонаступнику – компанії Chr. Hansen. Використання цього штаму ретельно досліджено у новонароджених, зокрема недоношених немовлят, дітей, вагітних жінок, дорослих та людей похилого віку. Безпека та пробіотичні властивості *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG®**) підтверджені численними науковими дослідженнями¹⁻⁸. Штам має високу стійкість до жовчі та кислот, що важливо для виживання бактерій при проходженні через шлунково-кишковий тракт та реалізації їх корисного потенціалу.

***Lactobacillus rhamnosus* GG** – ліофілізована культура лактобактерій, яка сприяє підтримці та відновленню нормального балансу

кишкової мікрофлори та нормальної роботи кишечника внаслідок прийому антибіотиків, при зміні характеру харчування тощо. Нормальний баланс кишкової мікрофлори сприяє підтримці нормального процесу травлення та імунітету.

До складу продукту також входять **середньоланцюгові тригліцериди**, виділені з кокосової олії, які за структурою аналогічні середньоланцюговим тригліцеридам грудного молока і кілька десятиліть використовуються в складі сумішей для дитячого харчування, а також застосовуються для поліпшення харчування дітей з низькою масою тіла. Цей компонент не тільки безпечний для застосування, але й пригнічує колонізацію грибів роду *Candida* в шлунково-кишковому тракті, які є причиною виникнення інфекцій у немовлят⁹.

Склад: середньоланцюгові тригліцериди (з кокосової олії), ліофілізована культура лактобактерій *Lactobacillus rhamnosus* GG DSM33156 (Probio-Tec® LGG®, Chr. Hansen) – 1x10⁹ КУО* в 1 краплі.



БЕЗ МОЛОКА
І МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ



БЕЗ
ЛАКТОЗИ



БЕЗ
ЦУКРУ



БЕЗ
КОНСЕРВАНТІВ



БЕЗ
ГМО

Харчова та енергетична цінність

Показник	Вміст у 6 краплях	Вміст у 12 краплях
Енергетична цінність	1.95 ккал (kcal) 8.00 кДж (kJ)	3.89 ккал (kcal) 16.00 кДж (kJ)
Білки	0,01 г (g)	0,02 г (g)
Жири	0,22 г (g)	0,44 г (g)
У тому числі насичених жирних кислот	0,21 г (g)	0,42 г (g)
Вуглеводи	0,01 г (g)	0,02 г (g)
У тому числі цукру	0,00 г (g)	0,01 г (g)
Клітковина	0,00 г (g)	0,00 г (g)
Солі	0,00 г (g)	0,01 г (g)
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG DSM33156	6x10 ⁹ КУО*	12x10 ⁹ КУО*

*КУО – колонієутворюючі одиниці.

Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована лікарем до раціону харчування в якості додаткового джерела *Lactobacillus rhamnosus* GG.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість¹⁰: під час прийому їжі: для дітей грудного та раннього віку – 1-6 крапель на добу, дітям віком від 3 до 12 років – 6 крапель на добу, дітям віком від 12 років та дорослим – 12 крапель на добу. Додавати краплі можна до їжі або безпосередньо в рот. Не змішувати краплі із занадто холодною або гарячою їжею.

Перед кожним використанням збовтати вміст флакону до отримання однорідної суспензії.

Не змінює смак напоїв та їжі.

У разі антибактеріальної терапії **АКТИВ ФЛОРА бебі+** можна приймати разом з антибіотиками. Для максимальної ефективності інтервал між прийомом крапель **АКТИВ ФЛОРА бебі+** та антибіотиком має складати 2 години.

Застереження щодо споживання: не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів. Не застосовувати недоношеним немовлятам з масою тіла менше 1000 г та народженим до 34 тижнів вагітності¹¹. Особам із значно зниженим імунітетом та недоношеним немовлятам застосовувати тільки за рекомендацією лікаря. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Не є лікарським засобом

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря

Термін придатності: 2 роки.

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°C в закритій упаковці в недоступному для дітей місці. Не заморозувати. Зберігати в оригінальній упаковці. Після першого відкриття продукт слід використати протягом 30 днів. На дні флакону може з'явитися осад, який не впливає на безпеку та якість продукту.

Форма випуску: краплі оральні у флаконі по 5 мл (ml) або по 10 мл (ml).

Країна виробництва: Польща.



Вироблено для:
Альбен Фарма АГ, Берн,
Швейцарія.

Імпортер: ПрАТ «НАТУРФАРМ», Україна, 04075 м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, буд. 30-А.

- 1 Arvola T, Laiho K, Torkkeli S, et al. Prophylactic *Lactobacillus* GG reduces antibiotic-associated diarrhea in children with respiratory infections: a randomized study. *Pediatrics*. 1999;104(5):e64. DOI: 10.1542/peds.104.5.e64.
- 2 Underwood MA, Salzman NH, Bennett SH, et al. A randomized placebo-controlled comparison of 2 prebiotic/probiotic combinations in preterm infants: impact on weight gain, intestinal microbiota, and fecal short-chain fatty acids. *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* 2009 ;48(2):216-225. DOI: 10.1097/MPG.0b013e31818de195.
- 3 Vanderhoof JA, Whitney DB, Antonson DL, et al. *Lactobacillus* GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. *J. Pediatr.* 1999;135(5):564-568. DOI: 10.1016/s0022-3476(99)70053-3.
- 4 Hojsak I, Abdovic S, Szajewska H, et al. *Lactobacillus* GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. *Pediatrics*. 2010;125(5):e1171-1177. DOI: 10.1542/peds.2009-2568.
- 5 Isolauri E, Juntunen M, Rautanen T, et al. A human *Lactobacillus* strain (*Lactobacillus casei* sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children. *Pediatrics*. 1991;88(1):90-97.
- 6 Gueimonde M, Sakata S, Kalliomäki M, et al. Effect of maternal consumption of *lactobacillus* GG on transfer and establishment of fecal bifidobacterial microbiota in neonates. *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* 2006;42(2):166-170. DOI: 10.1097/01.mpg.0000189346.25172.fid.
- 7 Lahtinen SJ, Boyle RJ, Kivivuori S, et al. Prenatal probiotic administration can influence Bifidobacterium microbiota development in infants at high risk of allergy. *J. Allergy Clin. Immunol.* 2009;123(2):499-501. DOI: 10.1016/j.jaci.2008.11.034.
- 8 Hatakka K, Ahola AJ, Yli-Knuuttila H, et al. Probiotics reduce the prevalence of oral candida in the elderly – a randomized controlled trial. *J. Dent. Res.* 2007;86(2):125-130. DOI: 10.1177/154405910708600204.
- 9 Arsenaault AB, Gunsalus KTW, Laforce-Nesbitt SS, et al. Dietary Supplementation With Medium-Chain Triglycerides Reduces Candida Gastrointestinal Colonization in Preterm Infants. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 2019;38(2):164-168. DOI: 10.1097/INF.0000000000002042.
- 10 Guarner F, Sanders ME, Szajewska H, et al. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: Probiotics and Prebiotics. *J. Clin. Gastroenterol.* 2024;58(6):533-553. DOI: 10.1097/MCG.0000000000002002.
- 11 Alshaikh BN, Ting J, Lee S, et al. Effectiveness and Risks of Probiotics in Preterm Infants. *Pediatrics*. 2025;155(3):e2024069102. DOI: 10.1542/peds.2024-069102.

****LGG®** є торговою маркою компанії Chr. Hansen (Данія).