

Лист-вкладиш по застосуванню дієтичної добавки з підсолоджувачем

Данноза УРО-АКУТ

(Dannosa® URO-ACUTE)

Склад: D-манноза; мальтодекстрин; сухий екстракт листя мучниці звичайної *Arctostaphylos uva-ursi* L. DER 30:1, містить щонайменше 20% арбутину; ароматизатор апельсиновий; регулятор кислотності лимонна кислота; антиспікаючі агенти діоксид кремнію, моно- і дигліцериди жирних кислот; підсолоджувач сукралоза.

Без ГМО

Активні інгредієнти в рекомендованій добовій кількості	1 саше	2 саше
D-манноза	1500 мг (mg)	3000 мг (mg)
сухий екстракт листя мучниці звичайної <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L, містить щонайменше 20% арбутину	500 мг (mg) 100 мг (mg)	1000 мг (mg) 200 мг (mg)

Данноза УРО-АКУТ є джерелом біологічно активних речовин D-маннози та екстракту листя мучниці звичайної, а саме арбутину.

Згідно відкритих загально-доступних джерел інформації, активні інгредієнти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості:

D-манноза

Інфекції сечовивідних шляхів переважно викликані уропатогенною бактерією *Escherichia coli*, яка має властивість прикріплюватися до слизових оболонок сечовивідної системи, що призводить до інфікування та розвитку запальної реакції. D-манноза запобігає прикріпленню бактерій *Escherichia coli* до слизової оболонки сечового міхура та сечовивідних шляхів, тим самим запобігаючи інфікуванню та розвитку запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій. D-манноза розглядається як природна альтернатива антибіотикам, яка не здійснює негативний вплив на природну мікрофлору. Після споживання, не менше ніж 90% D-маннози всмоктується у верхніх відділах кишківника і швидко виводиться з кровотоку нирками. Більшість D-маннози виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 30–60 хвилин, решта виводиться протягом наступних 8 годин. За цей час не відбувається значного підвищення рівня глюкози у крові.

Мучниця звичайна (*Arctostaphylos uva-ursi* L.) чинить антибактеріальну дію відносно *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus strains*, а також відносно *Candida albicans*.

Мучниця звичайна містить активні речовини, що характеризуються рядом біологічних ефектів, таких як: антисептичний, антибактеріальний, антиадгезивний, протизапальний, спазмолітичний, діуретичний.

Мучниця звичайна містить фенольні глікозиди, головним з яких є арбутин (гідрохінон- β -D-глюкопіранозид), який після споживання та метаболічного перетворення в організмі людини розпадається на глюкозу і похідні гідрохінону. Уропатогенні бактерії поглинають похідні гідрохінону, які надалі метаболізуються з утворенням вільного гідрохінону. Утворений усередині бактерій вільний гідрохінон має виражений антибактеріальний ефект за рахунок інгібування ферментативної активності мікроорганізмів, що сприяє їх загибелі.

Антимікробний ефект арбутину обумовлений здатністю пригнічувати зростання деяких збудників урологічних інфекцій, тим самим перешкоджаючи розвитку інфікування та запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій. Мікробіологічні дослідження *Escherichia coli* показали, що утворення вільного гідрохінону всередині *Escherichia coli* та патогенних бактерій не залежить від рівня рН сечі. Крім того, антисептична дія збільшується лише на тій ділянці, де присутні бактерії.

Рекомендації щодо споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин D-маннози та екстракту листя мучниці звичайної.

Не є лікарським засобом.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: особам віком від 18 років вживати по 1 саше 1 - 2 рази на добу, але не більше одного тижня. Вміст саше розчиняти в 200 мл (ml) води. Перед вживанням добавки необхідно спорожнити сечовий міхур. Для отримання позитивного ефекту рекомендується пити багато води (1-1,5 л (l)) упродовж доби, що сприяє збільшенню об'єму сечі.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Застереження до споживання: не споживати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, дітям віком до 18 років, у період вагітності та годування груддю. З обережністю приймати особам із цукровим діабетом.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Форма випуску: саше, по 3,02 г (g) кожне, по 7, 14, 20 шт. в картонній упаковці.

Умови зберігання: зберігати в закритій упаковці при температурі 15-25 °C в захищеному від вологи та світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник:

Мастер Фарм С.А., Польща



Вироблено для:

Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія

Імпортер:

ПрАТ «НАТУРФАРМ», Україна, 04075 м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, буд. 30-А